



Buddléia de David (Scrophulariacées)

Buddleja davidii

appelé aussi Arbre aux papillons

Description générale

Arbuste au port évasé.

Taille
de 1 à 5 m

Feuilles

10 à 30 cm de long, bords légèrement dentés, face supérieure vert foncé presque dépourvu de poils, face inférieure blanche

Fruits

petites capsules de 8 mm de long

Fleurs

blanches à pourpres, regroupées en inflorescences denses et pointues, mesurant environ 35 cm

Longévité

jusqu'à 37 ans

Très faible
abondance



Reproduction/propagation

Le Buddléia est pollinisé par les insectes, notamment les papillons. A maturité, les fruits se fendent en deux et libèrent de nombreuses graines (jusqu'à 3 millions de graines par an et par plant). Ces graines sont transportées sur de grandes distances par le vent, l'eau ou les véhicules. Elles entrent en dormance et peuvent rester dans le sol de nombreuses années. Pârvient à coloniser une nouvelle zone en une à deux années à partir de semis. Peut fleurir et fructifier dès la première année.

Cet arbuste a une croissance très rapide et rejette des souches si on le coupe. Peut atteindre une taille de 2 mètres un an après avoir été coupé à la base et peut se propager le long des cours d'eau par bouturage des tiges.

Habitat

Le Buddléia se développe plutôt dans les sites ouverts et perturbés comme les voies de chemin de fer, les bords de routes, les murs, les falaises, les chantiers, les friches et les ruines. Il colonise surtout les bords de cours d'eau jusqu'à plus de 2 000 m d'altitude. On le retrouve parfois en forêt.

Origine

Le missionnaire français Armand David a découvert le Buddléia en Chine et l'a décrit en 1869. Il l'a introduit au Jardin de Kew (à Londres) en 1896. Peu de temps après, l'Abbé Joseph Soulié l'a cultivé en France, dans la propriété de la famille Vilmorin. L'arbuste a plus largement été mis en culture à partir de 1916. Il a rapidement envahi les zones perturbées, plus particulièrement les décombres des villes bombardées pendant la 2^{de} guerre mondiale.

Nuisances

Sur le milieu naturel

Les peuplements denses de Buddléia concurrencent la végétation autochtone des cours d'eau et empêchent la reproduction et l'installation d'autres espèces d'arbres et d'arbustes. Le Buddleia est un colonisateur à courte durée de vie.

Les colonies mono-spécifiques de Buddléia empêchent l'accès aux cours d'eau. Les plants, superficiellement enracinés, sont facilement emportés lors des crues, formant des embâcles et provoquant l'érosion des berges.

Mesures préventives

☀ **Dans vos jardins :** même s'il n'est pas indispensable, le nectar est une source de nourriture pour les papillons. Si vous gardez votre Buddleia dans le jardin, il est très important de couper les inflorescences avant leur montée en graines. Si vous l'éliminez, il faut retirer les racines le mieux possible pour éviter les rejets, ensuite la plante doit être incinérée et non pas compostée. Evitez le sol nu à proximité des Buddleias.

☀ **Dans la nature :** l'élimination des Buddleias en zones naturelles demande beaucoup de travail, car il faut arracher les plantes si possible avec leurs racines. Des contrôles et arrachages des rejets sont indispensables. Il est important de favoriser la végétation naturelle pour ne pas laisser du sol nu, dans certaines situations on peut envisager un ensemencement avec des espèces indigènes adaptées.

Espèce toujours en vente dans les jardinerie, si vous désirez le planter, veuillez rester dans un contexte de jardin. Il faut impérativement le contrôler et le surveiller. Ne pas disséminer cette espèce par semis ou par transplantation.

